


Pink Glavne Sestavine

Tretma Pink-Aging je dermatološka raztopina, ki vsebuje 56 aktivnih sestavin in pomaga izboljšati vitalizacijo fibroblastnih celic, ki tvorijo osnovni strukturni okvir tkiv.




Peptides: Copper tripeptide, Palmitoyl Tripeptide-5, Octapeptide-7, Sh-Pentapeptide-19, SH-Oligopeptide-9, Sh-Octapeptide-4, Sh-Decapeptide-7, Sh-Polypeptide-1, Rh-Oligopeptide-1, Galloylpeptide-33, Sh-Polypeptide-9, Sh-Polypeptide-3, Sh-Polypeptide-22, Sh-oligopeptide-2, Vitamins: Vit C(Sodium Ascorbyl Phosphate), Vit E(tocopherol), Vit B7(biotin), Vit B1(thiamine), Vit B5(Pantanoole), Vit A (retinol)+Palmitate, Vit B6(pyridoxine), Vit B9(folic acid), Vit B12(cyanocobalamin), Vit B3(Niacinamide), Amino Acid: Glycin, Serine, Glutamic Acid, Aspartic acid, Leucin, Alanine, Lysin, Alginine, Tyrosine, Phenylalanine, Threonine, Proline, Valine, Isoleucine, Histidine, Methionine, Cystine, Mineral: Dextrin, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Coenzyme Ubiquonon, Active ingredients: Hydrolyzed Collagen, Adenosine, Sodium DNA, Glutathione, Sodium Hyaluronate, Human Adipocyte Conditioned Media Extract.

Pink Posebnosti

Posvetlitev kože

- ▶ Vsebuje glutation, ki posvetli kožo in odstrani proste radikale¹⁷
- ▶ Vsebuje 3 vrste encimov, ki prispevajo k sintezi glutationa v koži¹⁸
- ▶ Vsebuje 10 vrst vitaminov B-kompleksa (vitamin B12), ki izboljšujejo metabolizem kože²³

Relativna vsebnost melanina
Relativna aktivnost tirozinaze




Ref. International Journal of molecular Sciences (2018), NO. 9 pp2845-0

Pomlajevanje kože

- ▶ Vsebuje rastne faktorje, adenosinske receptorje A2, ki hitro pomagajo spodbuditi cikel regeneracije kože^{1,2,6,7,9,10,18,19,20,21}
- ▶ Vsebuje 6 vrst peptidov (EGF, FGF, IGF, TGF-β, bakrov tripeptid), ki pomagajo vitalizirati celice fibroblaste, ki tvorijo osnovni strukturni okvir tkiv^{12,13,14}
- ▶ Vsebuje neuropeptidni kompleks, ki je rastni faktor in pomaga vitalizirati celice fibroblaste ter spodbuditi rast krvnih žil, ki so ključnega pomena za proces celjenja ran

Wound healing effects of neurovax




Ref. BioFD&C R&D Center


Vlaženje kože

- ▶ Vsebuje aminokislinski kompleks, ki poveča vsebnost NMF (naravni vlažilni faktor)¹⁸
- ▶ Vsebuje 1,4 milijona daltonov hialuronske kisline z veliko molekularno maso, kar lahko odpravi pomanjkanje vlage v koži

Change of skin moisture over time



Postopek, v katerem koencim Q10 vpliva na sistem prenosa elektronov



Aktivacija energije kože

- ▶ Vsebuje vitamin B in aminokislino za sintezo koencimov
- ▶ Vsebuje ubikinon (coenzyme Q10), ki povezan priporoča k proizvodnji ATP²³

1.Masahiro Shirgal, AL, ZOOLOGICAL SCIENCE 17;661-666(2000) 2.Biochem. J. (2006) 400: 225-234 3.Mak, K.K. and Chan, S.Y. (2003) Epidermal growth factor as a biologic switch in hair growth cycle. The journal of biological chemistry. 278(28):26120-26124. 4.Alexandrescu, D. T., Kauffman, C. L., and Dasaru, C. A. (2009) The cutaneous epidermal growth factor network: Can it be translated clinically to stimulate hair growth? Dermatology online journal. 15 (3). 5.McElwee, K.J. and Sinclair, R. (2008) Hair physiology and its disorders. Drug discovery today: disease mechanisms. 5 (2): 163-171. 6.American Journal of Physiology: Renal Physiology (2007) 293: F1007-F1017 7.Imamura, T. (2014) Physiological functions and underlying mechanisms of fibroblast growth factor (FGF) family members: recent findings and implications for their pharmacological application. Biological and pharmaceutical bulletin. 37(7): 1081-1089. 8.Stefan Becket et al. J. Surgical Research 139, 217-221(2007) 9.The Journal of Biological Chemistry (2001) 276(21): 18185-18192 10.The New England Journal of Medicine (1999) 341(10): 738-746 11.Simeon A, et al. J Invest Dermatol. 115(6): 962-8(2000) 12.Maguire FX, et al. FEBS Lett. 238(2): 343-6(1998) 13.Miriam A, et al. European Journal of Cell Biology 81: 153-160(2002) 14.Margadant, C. and Sonnenburg, A. (2010) Integrin-TGF-β crosstalk in fibrosis, cancer and wound healing. EMBO Reports. 11(2): 97-105. 15.Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology 2014; 7: 267-274. 16.Biochim Biophys Acta. 2013 May; 1830(5): 3143-53. 17.Baden, et. Al. Biochem. Biophysics. Acta 322, p269-278, 1973. 18.PDRN improves angiogenesis and wound healing in experimental thermal injury: bio chemical pharmacology 77(2009) 1117-1124. 19.PDRN enhance the proliferation of human skin fibroblasts: involvement of A2 purinergic receptor subtypes. Life Science; Vol. 64, No. 18, pp 1661-1674. 19.20.Cell biochemistry and Function. 1999; 19: 21. Biochim Biophys Acta. 2013 May; 1830(5): 3143-53. doi: 10.1016/j.bbagen.2012.09.008. Epub 2012 Sep 17. 35. Journal of the American Academy of Dermatology. 1989; 21(2): 1p-30p. 22.Vitamin B12 Deficiency Induces Imbalance in Melanocytes Homeostasis: A Cellular Basis of Hypocobalaminemia Pigmentary Manifestations. Int J Mol Sci., 2018 Sep 19;19(9). pii: E2845. doi: 10.3390/ijms19092845. 23.The Effect of Coenzyme Q10 (Ubiquinone) on Random

Pink Cikli tretmaja

Faza 1. STIMULACIJA

3 tretmaji
z intervalom od
1 do 2 tednov

Faza 2. UČVRSTITEV

2 tretmaja
z intervalom
1 meseca


Faza 3. VZDRŽEVANJE

1 tretma
vsake 3 do 6
mesecev redno


Pink Postopek




RIBESKIN




Čeljustna linija • Vrat



Udrte sence • Udrta lica •
Udrtilne med vekami in lici



Linije na čelu • Linije okoli ust • Sence



Nasolabialne gube • Gube na ustnicah •
Marionetne gube

Čiščenje


Pink tretma / 20 min

Hlajenje in nega

Opozorilo

- Izogibajte se izpostavljanju sončni svetlobi. Na prostem se priporoča uporaba klobuka, maske in dežnika.
- Pred tretmajem se izogibajte uporabi tonikov z visoko vsebnostjo alkohola in krem, ki vsebujejo AHA, BHA in vitamin A.
- 12 ur po tretmaju kožo nežno čistite z vodo. Pri čiščenju se izogibajte uporabi velikega pritiska na kožo.
- Po tretmaju se izogibajte kajenju, alkoholu, savni ali prekomerni vadbi.
- Pijte 1,5 do 2 litra vode na dan.
- Po tretmaju se priporoča uporaba regenerativne vlažilne in antibakterijske kreme.
- 3-5 dni po tretmaju pazite, da kože ne obremenjujete z močnejšim pritiskanjem (drgnjenje, praskanje).

Pink Klinični rezultati

<p>Široke pore & Iritirana koža</p>  <p>3 tretmaji / 3 tedni</p> <p>Pozna 40. leta, ženska</p>	<p>Široke pore</p>  <p>4 tretmajev / 5 tednov</p> <p>1 teden 2 teden 3 teden 4 teden 5 teden</p> <p>Pozna 40. leta, ženska</p>	
<p>Široke pore & Iritirana koža</p>  <p>3 tretmaji / 3 tedni</p> <p>Zgodnja 40. leta, ženska</p>	<p>Starejša koža z gubami</p>  <p>2 tretmaja / 3 tedni</p> <p>Zgodnja 60. leta, ženska</p>	<p>Problematična koža & Široke pore</p>  <p>2 tretmaja / 3 tedni</p> <p>Zgodnja 30. leta, ženska</p>

Pink Pakiranje

